

Conoce el poder de



¿GUSANO BARRENADOR?

QUE NO DEVORE TUS GANANCIAS.



Curar rápido es ahorrar dinero.
Una gusanera no tratada a tiempo significa pérdida de peso y riesgo de muerte.
Matagusanox te ofrece

4 BENEFICIOS EN 1 SOLA APLICACIÓN:

1

MATA AL GUSANO AL INSTANTE
(ACCIÓN PROFUNDA)



2

AHUYENTA A LA MOSCA
(EFECTO RESIDUAL)



3

DESINFECTA LA HERIDA
(ANTISÉPTICO)



4

SECA Y SELLA
(CICATRIZANTE)



GUÍA DE APLICACIÓN EFICAZ

Indicaciones previas a su aplicación: Debe hacer uso de guantes de latex, cubrebocas y goggles. Evite intoxicación del operario por el contacto del producto con piel y mucosas.

CATEGORIZACIÓN DE LA ETAPA DE EVOLUCIÓN DE LA GUSANERA	APARIENCIA VISUAL DE LA HERIDA	SIGNOS ASOCIADOS	ENFOQUE DE TRATAMIENTO-PRONÓSTICO
I (Leve)	Mínima invasión de larvas. Lesión leve de tejidos, sin inflamación y necrosis.	Lamido y molestia leve, ligero enrojecimiento del área. Huevecillos blancos en los bordes o larvas diminutas casi imperceptibles.	Favorable. Limpieza local, aplicación de MATAGUSANOX.
II (Moderado)	Herida con poca profundidad, larvas visibles, necrosis localizada.	Dolor evidente, secreción en herida, disminución del apetito. Larvas visibles en movimiento.	Regular. Limpieza local, extracción manual de larvas, aplicación de MATAGUSANOX, tratamiento de antibiótico y control de dolor-inflamación.
III (Severo)	Lesión profunda, gran cantidad de larvas, necrosis extendida, compromiso de tejido circundante.	Dolor evidente e intenso, inapetencia, fiebre, letargo. Caverna profunda con gran destrucción de músculo y tejido muerto. Olor fétido, pus.	Reservado. Limpieza local y profunda, extracción manual de larvas, aplicación de MATAGUSANOX, tratamiento de antibiótico y control de dolor-inflamación.
IV (Crítico)	Heridas múltiples y extensas, posible exposición de huesos. Necrosis severa y daño sistémico.	Múltiples generaciones de larvas activas. Pus, shock, lesión de tejidos circundantes. Según criterio y valoración del paciente; se sugiere eutanasia.	Letal. Limpieza quirúrgica, extracción manual de larvas, aplicación de MATAGUSANOX, tratamiento de antibiótico (doble esquema) y control de dolor-inflamación.

La detección temprana es clave para evitar la progresión de la lesión y reducir costos de tratamiento. Pregunta a tu médico veterinario sobre las opciones de tratamiento que Tornel tiene específicamente para las categorías de lesiones II, III y IV.

1 Preparación: Remover mecánicamente el exceso de suciedad, tejido necrótico y larvas de la herida. Utilizar material estéril para la limpieza de la zona.

Inactivación inmediata y total de las larvas extraídas La disposición final de las larvas extraídas es una de las razones por las que el ciclo de la mosca del GBG persiste: una sola larva de tercer estadio que caiga al suelo puede enterrarse, pupar y emerger como mosca adulta en cuestión de días. Para la inactivación de las larvas y romper el ciclo de la mosca (*Cochliomyia hominivorax*), deposite las larvas extraídas y las que se broten de la herida en un recipiente con una solución de alcohol al 70% o en agua hirviendo o clorada y hacer su disposición final incinerándolas o bien, destinándolas en envase cerrado a empresas que realizan el desecho de tejidos biológico infecciosos.

2 Aplicación: Para que el producto se distribuya adecuadamente, la lesión debe estar seca. Administrar la cantidad suficiente de MATAGUSANOX para que este llegue a las áreas profundas de la miasis, así como en la superficie y alrededor de la zona afectada. En heridas profunda, asegúrese de que la aspersión penetre hasta el fondo de la cavidad.

3 Frecuencia: Realizar una o más aplicaciones, dependiendo de las características de la miasis. En caso necesario repetir tratamiento a las 24h o 48h después de la primera aplicación; dependiendo de la valoración del Médico Veterinario.

Tiempo de retiro El tiempo de retiro para sacrificio o consumo de derivados para consumo humano es cero días ya que, por carecer de acción sistémica, no se absorbe y por lo tanto no se acumula.

CONSTATADO POR EL CENTRO NACIONAL DE REFERENCIA EN PARASITOLOGÍA ANIMAL Y TECNOLOGÍA ANALÍTICA (CENAPA)

DISPONIBLE EN:

250 ml 500 ml 1 litro

Número de Registro
SENASICA
Q-0473-002

Distribuido por:

Tornel
LABORATORIOS

Encuétralo con tu distribuidor:

